

Ordonnance / Protocole médical pour l'administration d'une thérapie intraveineuse pour le traitement de la migraine chez UrgentMD Inc.

URGENT MD

Le professionnel de la santé référent a :

- Évalué le/la patient(e)
- Confirmé des antécédents de céphalées migraineuses
- Diagnostiqué un épisode actuel de migraine
- Écarté la possibilité d'une autre cause aiguë et potentiellement mortelle de céphalée

Critères d'exclusion :

- Céphalée d'apparition récente / premier diagnostic de migraine
- État clinique instable ou apparence malade
- Suspicion que la céphalée soit causée par une hémorragie sous-arachnoïdienne, une méningite, une thrombose du sinus central ou toute autre cause non migraineuse
- Allergie connue aux traitements prescrits contre la migraine
- Incapacité du/de la patient(e) à se mobiliser de façon autonome sans aide (sauf si aidé(e) par son proche aidant)

Prescrire au moins un des médicaments suivants (Il est recommandé de cocher tous les traitements, sauf en cas de contre-indication connue) :

Métoclopramide 10 mg IV x 1, à administrer sur une durée de X minutes, dilué dans 50 mL de solution saline normale

Kétorolac 10 mg IV x 1, à diluer dans 50 mL de solution saline normale

Peut administrer une dose additionnelle de Kétorolac 10 mg IV x 1 au besoin (PRN), à diluer dans 50 mL de solution saline normale

Décadron 10 mg IV x 1, à diluer dans 50 mL de solution saline normale

Acétaminophène (Tylenol) 1 g PO x 1

Bolus de liquid intraveineux :

Solution saline normale 500 mL

1000 mL IV bolus x 1

En cas de réaction allergique, l'infirmier(ère) responsable de l'administration de la perfusion peut administrer l'un ou plusieurs des médicaments suivants :

Épinéphrine (1:1000) : 0,3 à 0,5 mg IM, toutes les 15 minutes au besoin (PRN)

Diphenhydramine 50 mg IV/PO x 1, au besoin (Si administrée par voie intraveineuse, diluer dans 50 mL de solution saline normale)

Famotidine 20 mg IV/PO x 1, au besoin (Si administrée par voie intraveineuse, diluer dans 50 mL de solution saline normale)

Décadron 10 mg IV x 1 ou Prednisone 50 mg PO x 1, au besoin (Si Decadron administré en IV, diluer dans 50 mL de solution saline normale)

En cas de réaction dystonique associée à l'utilisation de Métoclopramide, l'infirmier(ère) peut administrer :
Diphenhydramine 50 mg IV x 1, à diluer dans 50 mL de solution saline normale

Responsabilités infirmières en cas de réaction indésirable :

Évaluer l'état clinique du / de la patient(e)

Surveiller les signes vitaux

Administrer les médicaments ci-dessus selon les besoins cliniques

Composer le **9-1-1** pour un transport immédiat à l'hôpital afin d'assurer une prise en charge définitive

Fournir les renseignements nécessaires aux **services préhospitaliers d'urgence (SPU)**

Notes du personnel infirmier :

Attestation du prescripteur et ordonnance pour l'administration de médicaments chez UrgentMD Inc.

Je certifie avoir évalué le/la patient(e) et je le/la réfère à UrgentMD Inc. avec une ordonnance pour l'administration d'un traitement intraveineux contre la migraine. Ce traitement sera administré par une infirmière autorisée dans le cadre d'un acte délégué. Je reconnais également être informé(e) que le/la patient(e) ne sera pas vu(e) par un médecin ni par une infirmière praticienne spécialisée chez UrgentMD.